

**2018 Yeterlik Sınavı**

1. Psoriatik hastada fototerapi tedavisi sonrası oluşan Woronof halkasının oluşumunda hangi mediatör sorumludur?

*Dermatolojik cerrahi ve foto(kemo)terapi (Zorluk derecesi: 4)*

- A) Fosfodiesteraz
- B) Prostaglandin
- C) Prostaglandin E2**
- D) Fosfolipaz
- E) Kallikrein

2. İki yaşından beri atopik dermatit tanısı olan 11 yaşında çocuk hastada bir gün önce yüzün sol tarafında aniden ortaya çıkan, boyuna doğru yayılan veziküller mevcuttur. Tek subjektif yakınma yanma hissidir. Gözde perioküler bölgede, kollar ve ekstremitelerde fleksör yüzlerinde ekzema plakları eşlik etmektedir. Dermatolojik muayenede var olan atopik dermatit plakları üzerinde grupe veziküller ve zımba ile delinmiş tarzda erozyonlar saptanmıştır. Hastanın tanısını işaretleyiniz?

*Dermatitler, ekzemalar, immünyetmezlik sendromları (Zorluk derecesi: 2)*

- A) Ekzema herpetikum**
- B) Tinea korporis
- C) Sekonder impetiginizasyon
- D) Kontakt dermatit
- E) Atopik dermatit alevlenmesi

3. 65 yaşında erkek hasta, son 6 ayda artan multipl seboreik keratozları nedeniyle başvurdu. Kilo kaybı şikayeti de olan hastanın endoskopisinde alınan mide biyopsisi adenokarsinom olarak geldi.

Hastada mevcut bolan tablonun adı nedir?

*Epidermal nevus ve neoplaziler (Zorluk derecesi: 2)*

- A) Muir-Torre Sendromu
- B) Leser-Trelat belirtisi**
- C) Borst-Jadasshon fenomeni
- D) Wickham fenomeni
- E) Auspitz fenomeni

4. Seboreik keratozun histolojik tiplerinden **olmayan** seçeneği işaretleyiniz.

*Epidermal nevus ve neoplaziler (Zorluk derecesi: 4)*

- A) Akantotik
- B) Hiperkeratotik
- C) Retiküle
- D) Likenoid**
- E) Klonal

5. Atopik dermatit patogenezinde yer alan deri bariyer fonksiyon bozukluğu ile ilgili hangisi yanlıştır?

*Dermatitler, ekzemalar, immünyetmezlik sendromları (Zorluk derecesi: 4)*

- A) Filaggrin yapısında bozulma
- B) Stratum korneum pH'sında bozulma
- C) Kemotriptik enzimlerin ekspresyonunda azalma**
- D) Deri seramidlerinde azalma
- E) Epidermal farklılaşma kompleksine ait proteinlerde azalma.

6. Bockhart'ın foliküler impetigosunda etken olan ana patojen hangisidir?

*Bakteriyel infeksiyonlar (Zorluk derecesi: 2)*

- A) Staphylococcus aureus
- B) Staphylococcus epidermidis
- C) Streptococcus pyogenes
- D) Pseudomonas aeruginosa
- E) Propionibacterium acnes

7. Hangisi keratin 17 gen mutasyonu sonucu meydana gelir?

*Diğerleri (Zorluk derecesi: 4)*

- A) Steatokistoma multipleks
- B) Bronkojenik kist
- C) Tiroglossal duktus kisti
- D) Mukosel
- E) Epidermoid kist

8. Hangi hastalığın papülleri dermo-epidermal yerleşimlidir?

*Dermatoloji, dermatopatoloji ve dermatoimmunolojiye giriş (Zorluk derecesi: 3)*

- A) Prurigo
- B) Verruka vulgaris
- C) liken planus
- D) Papüler ürtiker
- E) Eritema kronikum migrans

9. Stafilokoksik Haşlanmış Deri Sendromu için **yanlış** seçeneği işaretleyiniz.

*Bakteriyel enfeksiyonlar (Zorluk derecesi: 3)*

- A) Yenidoğanlarda ve erken çocukluk çağında sık görülür.
- B) Nikolsky bulgusu pozitifdir.
- C) Çocuklar, erişkinlere göre daha kötü prognoza sahiptir.
- D) Epidermis içinde granüler tabakada ayrışma görülür.
- E) Böbrek yetmezliği ve hemodialize giren erişkinlerde risk fazladır.

10. Kızıl hakkındaki **yanlış** olan ifadeyi işaretleyiniz?

*Bakteriyel enfeksiyonlar (Zorluk derecesi: 3)*

- A) Streptokokkal pirojenik endotoksinlere bağlı olarak gelişir.
- B) İnkubasyon süresi 1-7 gün arasında değişir.
- C) Pastia çizgileri aksilla, antekubital ve inguinal alanlarda görülen lineer peteşial çizgilerdir
- D) El ve ayaklarda gelişen deskuamasyon 2-6 hafta devam edebilir.
- E) Yanık sonrası veya cerrahi enfeksiyonların komplikasyonu olarak gelişebilir.

11. Hangisi ürtikerin immünolojik mekanizmalarından **değildir**?

*Eritem ve ürtiker (Zorluk derecesi: 2)*

- A) FcERI veya IgE'ye karşı otoantikolar
- B) IgE bağımlı reaksiyon
- C) İmmün kompleks aracılı reaksiyon
- D) Antiinflamatuvar ilaçlarla ürtiker gelişimi
- E) Kompleman bağımlı reaksiyon

12. Ürtikerin eşlik etmediği, C4 seviyesinin düşük, C1 esterase inhibitörü ve C1q seviyelerinin normal olduğu anjiödemli bir hastada öncelikli tanı hangisidir?

*Eritem ve ürtiker (Zorluk derecesi: 4)*

- A) Tip 3 herediter anjioödem
- B) Tip 2 herediter anjioödem**
- C) Tip 1 herediter anjioödem
- D) İlaç ilişkili anjioödem
- E) Clarkson sendromu

13. Bazal hücreli karsinom ile ilgili verilen seçeneklerden doğru olanı işaretleyiniz.

*Epidermal nevus ve neoplaziler (Zorluk derecesi: 3)*

- A) En sık görülen tipi yüzeysel bazal hücreli karsinomdur.
- B) Metatipik bazal hücreli karsinomun metastaz oranı %5'ten fazladır.**
- C) Ülserasyon bütün klinik alt tiplerde görülmekle birlikte en sık morfeiform tipte görülür.
- D) Lokal rekürrens en az görüldüğü alt tip mikronodülerdir.
- E) Fibroepitelyal bazal hücreli karsinomda pigmente nodüler lezyonlar sıklıkla yüz bölgesine yerleşir.

14. Subkorneal ve intraepidermal nötrofilik püstülözün ayırıcı tanısında yer alan hastalıklardan hangisinde spongiform püstüller **bulunmaz**?

*Dermatoloji, dermatopatoloji ve dermatoimmunolojiye giriş (Zorluk derecesi: 5)*

- A) Püstüler psoriasis
- B) Akut jeneralize ekzantematöz püstüloz
- C) Subkorneal püstüler dermatoz**
- D) Amikrobiyal intertriginöz püstülozis
- E) İmpetigo herpetiformis

15. Anjioödem ve C1 inhibitör yetmezliği saptanan hastalarda hangi ilaç grubu **kontrendikedir**?

*Eritem ve ürtiker (Zorluk derecesi: 2)*

- A) Kalsiyum kanal blokörleri
- B) Makrolid antibiyotikler
- C) Anjiyotensin dönüştürücü enzim inhibitörleri**
- D) Beta adrenerjik blokörler
- E) Biguanidler

16. Multiple bazal hücreli karsinom ile doğrudan **ilişkilendirilmeyen** sendromu işaretleyiniz.

*Epidermal nevus ve neoplaziler (Zorluk derecesi: 2)*

- A) Gorlin sendromu
- B) Howel Ewans sendromu**
- C) Bazex sendromu
- D) Rombo sendromu
- E) Unilateral bazal hücreli nevus sendromu

17. Sık karşılaşılan misetoma etkenlerinden **olmayan** işaretleyiniz.

*Fungus ve mayalara bağlı hastalıklar (Zorluk derecesi: 3)*

- A) Madurella mycetomatis
- B) Nocardia brasilienses
- C) Actinomadura madurae
- D) Pseudallescheria boydii
- E) Histoplasma capsulatum**

18. Skuamöz hücreli karsinomada prognoza etkisi **olmayan** seçeneği işaretleyiniz.

*Epidermal nevus ve neoplaziler (Zorluk derecesi: 2)*

- A) Desmoplastik tip
- B) Akantolitik tip**
- C) Horizontal yerleşim
- D) Perinöral tutulum
- E) Tümör lokalizasyonu

19. On beş yaşında erkek hasta, ellerde ve bacaklarda zaman zaman ağrı, uyuşukluk şikayeti bulunmaktadır; ağrı bazen karına doğru yayılmaktadır. Ara sıra kulak çınlaması da eşlik etmektedir. Dermatolojik muayenesinde; karın, uyluk ve kalçada 3-4 mm çaplı multipl kırmızı-kahve renkli papüller gözlenmiştir. Bu papüllerin histopatolojik incelemesinde; papiller dermiste vasküler ektaziler ve epidermal hiperplazi, endotel hücrelerde lipid içeren sitoplazmik vakuoller (PAS+ ve Sudan black+) görülmüştür. Göz muayenesinde korneal opasite ve idrarda globo triasil seramidinin yüksekliği tespit edilmiştir. Hastanın olası tanısı nedir?

*Endokrin, nutrisyonel ve metabolizma hastalıkları (Zorluk derecesi: 4)*

- A) Schindler Hastalığı
- B) Fukosidoz
- C) Hurler Sendromu
- D) Fabry Hastalığı**
- E) Niemann-Pick Hastalığı

20. *Malassezia furfur*'un **neden olmadığı** tabloyu işaretleyiniz.

*Fungus ve mayalara bağlı hastalıklar (Zorluk derecesi: 2)*

- A) Folikülit
- B) Blefarit
- C) Seboreik dermatit
- D) Eozinofilik Püstüloz**
- E) Neonatal Sefalik Püstüloz

21. Normolipemik düz ksantomlar en sık hangi hastalıkla birliktelik gösterir?

*Endokrin, nutrisyonel ve metabolizma hastalıkları (Zorluk derecesi: 4)*

- A) Diyabetes mellitus
- B) Monoklonal gamopati**
- C) Primer biliyer siroz
- D) Biliyer atrezi
- E) Pankreas kanseri

22. On iki saatten uzun sürebilen ürtiker plakları ile karakterize ürtiker tipi hangisidir?

*Eritem ve ürtiker (Zorluk derecesi: 3)*

- A) Kolinerjik ürtiker
- B) Solar ürtiker
- C) Basınç ürtikeri**
- D) Soğuk ürtikeri
- E) Akuajenik ürtiker

23. Deride doğrudan vazodilatasyona ve damar geçirgenliğinin artmasına **neden olmayan** mediyatörü işaretleyiniz.

*Eritem ve ürtiker (Zorluk derecesi: 4)*

- A) Bradikinin
- B) Histamin
- C) Lökotrien C4 ve D2
- D) Prostoglandin D2
- E) Tromboksan A2**

24. Mast hücreleri ile ilgili **yanlış** seçeneği işaretleyiniz.

*Dermatoloji, dermatopatoloji ve dermatoimmunolojiye giriş (Zorluk derecesi: 2)*

- A) C5a reseptörü kutanöz mast hücrelerinde mevcuttur.
- B) Mast hücreleri asıl olarak dolaşımda olup gerektiğinde dokuya geçer.
- C) Mast hücreleri erken alerjik reaksiyonlarda önemli rol oynar.
- D) Mast hücre yüzeyinde yer alan FcER1, yüksek afiniteli IgE reseptörüdür.
- E) Mast hücreleri morfolojik ve fonksiyonel olarak bazofillerle benzerdir.

25. Tinea kapitisde hem ektotriks hem endotriks tipte kıl enfeksiyonu yapan dermatofit etkenini işaretleyiniz.

*Fungus ve mayalara bağlı hastalıklar (Zorluk derecesi: 4)*

- A) T. rubrum
- B) T. schoenleinii
- C) T. soudanense
- D) T. tonsurans
- E) T. violaceum

26. Deride keloid benzeri nodüllerle karakterize mantar enfeksiyonunu işaretleyiniz.

*Fungus ve mayalara bağlı hastalıklar (Zorluk derecesi: 3)*

- A) Sporotrikozis
- B) Miçetoma
- C) Blastomikozis
- D) Lobomikozis
- E) Kromoblastomikozis

27. Sistemik kullanımı formaldehide bağlı alerjik kontakt dermatitin alevlenmesine yol açabilen hangisidir?

*Dermatitler, ekzemalar, immünyetmezlik sendromları (Zorluk derecesi: 4)*

- A) Naproksen
- B) Nitrofurazon
- C) Diklofenak
- D) Aspartam
- E) Peru balzamu

28. PUVA tedavisinin, hastalığı önleme amacıyla tercih edildiği hastalık hangisidir?

*Dermatolojik cerrahi ve foto(kemo)terapi (Zorluk derecesi: 2)*

- A) Psoriasis
- B) Atopik dermatit
- C) Vitiligo
- D) Solar ürtiker
- E) Kutanoz graft versus host hastalığı

29. Nongonokoksik üretritlerle ilişkili olarak hangisi **yanlıştır**?

*Cinsel yolla bulaşan hastalıklar (Zorluk derecesi: 3)*

- A) Nongonokoksik üretritlerin %75'i asemptomatik seyreder
- B) Sarı, yeşil, kahverengi veya hemorajik üretral akıntı olabilir
- C) Kaşıntı görülebilir
- D) İnfertiliteye sebep olabilir
- E) Reaktif artrite sebep olabilir

30. Alkolizm için disülfiram kullanmaya başlayan bir hastada, üç gün sonra yüz, gövde ve ekstremitelerde gelişen oldukça yaygın, eritemli, ekzantematöz döküntü; ilacın kesilmesi sonrasında gerilemiştir. "Sistemik alerjik dermatit" düşünülen bu olguya uygulanan standart yama testinde hangi antijenin pozitif olması beklenir ?

*Dermatitler, ekzemalar, immünyetmezlik sendromları (Zorluk derecesi: 4)*

- A) Lanolin alkol
- B) Tiuram miks
- C) Peru balsamı
- D) Fragrans miks
- E) Formaldehit

31. Kronik aktinik dermatitle ilgili hangisi yanlıştır?

*Fiziksel faktörlerle olan dermatozlar (Zorluk derecesi: 3)*

- A) En sık yaşlı erkeklerde görülür.
- B) UVA, UVB ve görünür ışığa karşı fotosensitivite gösterir.
- C) Üst göz kapağı, kulak arkası gibi güneş görmeyen bölgelerde bile tutulum görülür.
- D) Yama ve fotoyama testleri tanıda yardımcıdır.
- E) Beraberinde alerjik kontak duyarlılık sık görülür.

32. Hangisi Kutanöz Graft Versus Host Hastalığında görülmesi beklenen bir bulgu **değildir**?

*Dermatitler, ekzemalar, immünyetmezlik sendromları (Zorluk derecesi: 2)*

- A) Vitiligo benzeri depigmentasyon
- B) Alopesi
- C) Eritema anülare sentrifigum
- D) Tırnak distrofisi
- E) Ülserasyon

33. Fotosensitif ilaç reaksiyonları ile ilgili olarak doğru seçeneği işaretleyiniz.

*Fiziksel faktörlerle olan dermatozlar (Zorluk derecesi: 3)*

- A) Vorikonazol kutanöz skuamöz hücreli karsinoma sebep olabilir.
- B) Fototoksik ilaç reaksiyonlarında fotoyama testi pozitifdir.
- C) Florokinolonlar içerisinde fotosensitiviteye en çok sebep olan levofloksasindir.
- D) Vemurafenib UVB spektrumunda fototoksositeye yol açar.
- E) Naproksen ile ilişkili pödo porfiride idrar porfirin düzeyleri yüksektir.

34. Eritrodermi olan bir çocuk hastada beraberinde atopik dermatit benzeri lezyonlar, trikoreksis invajinata, immün yetmezlik varsa hangi tablo düşünülür?

*Psoriasis, palmoplantar erüpsiyonlar, püstüler dermatitler ve eritrodermi (Zorluk derecesi: 3)*

- A) Wiskott Aldrich sendromu
- B) Hiperimmunglobulin E sendromu
- C) Nonbüllöz konjenital iktiyoziform eritroderma
- D) Netherton sendromu
- E) Cockayne sendromu

35. Atipik melanositik nevus için **yanlış** seçeneği işaretleyiniz.

*Melanositik nevus ve neoplaziler (Zorluk derecesi: 3)*

- A) Asimetri, düzensiz kenar ve renk varyasyonu gösteren nevuslerdir.
- B) Puberteye yakın ortaya çıkarlar.
- C) Aile öyküsü olanlarda melanoma dönüşüm riski yüksektir.
- D) Bazen erüptif olarak da belirebilirler.
- E) En sık gövdeyi tutar.

36. Yaygın pruritus nedeni **olmayan** seçeneği işaretleyiniz.

*Kaşıntı ve nörokutan dermatozlar (Zorluk derecesi: 2)*

- A) Opioid kullanımı
- B) Gebelik kolestazı
- C) Diyabetes mellitus**
- D) Polisitemia vera
- E) Demir eksikliği

37. Çocukluk çağı melanomları için **yanlış** seçeneği işaretleyiniz.

*Melanositik nevus ve neoplaziler (Zorluk derecesi: 3)*

- A) Çok nadir görülür.
- B) Prognoz erişkinlere göre daha kötüdür.**
- C) Erişkin melanoma risk faktörleri ile benzerdir.
- D) Kseroderma pigmentosumun prepubertal insidansa etkisi azdır.
- E) Histopatolojik olarak Spitz nevus özellikleri bu yaşta erişkine göre daha sıktır.

38. Hangisi antifosfolipid sendromunun laboratuvar bulgularından **değildir?**

*Konnektif doku hastalıkları (Zorluk derecesi: 3)*

- A) VDRL pozitifliği
- B) ANCA pozitifliği**
- C) Lupus antikoagulanı pozitifliği
- D) Antikardiyolipin antikor pozitifliği
- E) Aktive parsiyel tromboplastin (aPTT) zamanında uzama

39. İlaç kullanımını takiben 2 hafta sonrasında deride morbiliform erüpsiyon, kanda atipik lenfositler ve eozinofili, sistemlerin muayene ve incelemelerinde adenopati, hepatit, nefrit ve pnömonisi olan bir hastada hangisi **öncelikle** dikkate alınmalıdır?

*İlaç reaksiyonları (Zorluk derecesi: 2)*

- A) Ürtikeryal ilaç reaksiyonu
- B) Akut Jeneralize Ekzantematöz Püstüloz
- C) Toksik Epidermal Nekroliz
- D) DRESS**
- E) Makülopapüler-morbiliform ilaç reaksiyonu

40. Hangisi orta-şiddetli renal pruritusta birinci basamak tedaviler arasında yer alır?

*Kaşıntı ve nörokutan dermatozlar (Zorluk derecesi: 3)*

- A) Ketotifen
- B) Doksepin
- C) Sertralin
- D) Pregabalin**
- E) Naltrekson

41. Ayırıştırılmış deri (salt-split) immunfloresan test, hangi hastalıkların ayırıcı tanısında kullanılır?

*Kronik büllü hastalıklar (Zorluk derecesi: 3)*

- A) Pemfigus vulgaris - Büllöz pemfigoid
- B) Paraneoplastik pemfigus - Büllöz pemfigoid
- C) Lineer IgA Hastalığı - Pemfigus vulgaris
- D) Büllöz pemfigoid - Akiz epidermolizis bülloza**
- E) Akiz epidermolizis bülloza - Mukozal pemfigoid

42. Mukozal (sikatrisyel) pemfigoid'de malignite ile ilişkilendirilen antijen hangisidir?

*Kronik büllü hastalıklar (Zorluk derecesi: 4)*

- A) BP180
- B) BP230
- C) Laminin 332
- D) Kollajen tip VII
- E) Envoplakin

43. Elli beş yaşında erkek hasta, kronik böbrek yetmezliği nedeni ile uzun süre hospitalize edilmesi sonrasında, sırtta ve göğüste çok sayıda kaşıntılı translusent papüller ortaya çıkıyor. Alınan biyopsinin histopatolojik incelemesinde akantoliz saptanan bu hasta için en olası tanı ve tedavi önerisi nedir?

*Kronik büllü hastalıklar (Zorluk derecesi: 3)*

- A) Darier hastalığı-topikal retinoid
- B) Hailey-Hailey hastalığı- topikal antibiyotik
- C) Pemfigus foliaceus-sistemik steroid
- D) Grover hastalığı-topikal steroid
- E) Galli Galli hastalığı-topikal steroid

44. Aşağıda yer alan fotoğraflardan hangisi ya da hangileri bir lepromatöz lepra hastasına ait **değildir**?

*Mikobakteriyal hastalıklar (Zorluk derecesi: 2)*

- A) Resim1
- B) Resim 2 ve 3
- C) Resim 3 ve 4
- D) Resim 4
- E) Resim 5

45. Erken evre mikozis fungoides (IA, IB, IIA) tedavisi için **uygun olmayan** seçeneği işaretleyiniz.

*Kutanöz lenfoid hiperplazi, lenfomalar (Zorluk derecesi: 3)*

- A) Topikal steroidler
- B) Foto(kemo)terapi
- C) Sistemik interferon
- D) Total deri elektron bombardımanı
- E) Ekstrakorporyal fotoferez

46. Hangisi poliosis görülen hastalıklardan **değildir**?

*Pigmentasyon bozuklukları (Zorluk derecesi: 3)*

- A) Vogt-Koyanagi-Harada sendromu
- B) Tuberoskleroz
- C) Piebaldizm
- D) Waardenburg sendromu
- E) LEOPARD sendromu

47. Marjinal B hücreli lenfomalı hastalarda evreleme için **gerekli olmayan** tetkik hangisidir?

*Kutanöz lenfoid hiperplazi, lenfomalar (Zorluk derecesi: 3)*

- A) Oral kavite muayenesi
- B) Batın ultrasonu ve yüzeysel lenf nodu ultrasonu
- C) B semptomlarının araştırılması
- D) Flow sitometri
- E) Serum LDH düzeyi

48. Aşağıdaki ilaç reaksiyonlarından hangisinde önceki lezyon yerine ilaç yama testi tanı için önerilmektedir?



*İlaç reaksiyonları (Zorluk derecesi: 2)*

- A) Anafilaksi
- B) İlaça bağlı hipersensitivite sendromu (DIHS)
- C) Fiks ilaç erüpsiyonu
- D) Stevens-Johnson sendromu
- E) Toksik epidermal nekroliz

49. Oral skuamöz hücreli karsinom için doğru ifade hangisidir?

*Müköz membran hastalıkları (Zorluk derecesi: 2)*

- A) Oral kavitenin nadir tümörlerinden biridir.
- B) Histopatolojik özellikleri deride görülen skuamöz hücreli karsinomdan belirgin farklılıklar gösterir.
- C) Oral kavitede en sık görüldüğü lokalizasyonlar dilin lateral ve ventral yüzeyleri ile ağız tabanıdır.
- D) Derideki skuamöz hücreli karsinoma göre daha iyi seyir izler.
- E) Oluşumunda etyolojik faktörlerin rolü belirgin değildir.

50. Dermatomyozitte görülen deri bulguları ile ilgili hangisi **yanlıştır**?

*Konnektif doku hastalıkları (Zorluk derecesi: 3)*

- A) Holster belirtisi uyluk lateralinin poikilodermasıdır
- B) Şal belirtisi fotodağılım gösteren poikilodermadır
- C) Kalsinozis kutis özellikle erişkin dermatomyozitinde sıktır
- D) Gottron belirtisi diz ve dirseklerde viyolese diskolorasyondur
- E) Kütiküla distrofisi ve tırnak kıvrımı telenjektazileri tipiktir

51. Miks Bağ Doku Hastalarının hemen hemen hepsinde pozitif olan otoantikör hangisidir?

*Konnektif doku hastalıkları (Zorluk derecesi: 2)*

- A) Anti-fosfolipid
- B) Anti-sentromer
- C) Anti-topoizomeraz
- D) Anti-ribonükleoprotein
- E) Anti-tRNAsentetaz

52. Konjenital poikilodermi **nedeni olmayan** seçeneği işaretleyiniz.

*Genodermatozlar ve konjenital anormallikler (Zorluk derecesi: 4)*

- A) Rothmund-Thomson sendromu
- B) Kindler sendromu
- C) Fakomatozis pigmentovaskülar
- D) Cockayne sendromu
- E) Ataksi telenjektazi sendromu

53. PTEN gen mutasyonu ektoderm, mezoderm, endoderm kökenli hamartomatöz tümörler ile karakterize genodermatoz hangisidir?

*Genodermatozlar ve konjenital anormallikler (Zorluk derecesi: 3)*

- A) MEN tip I
- B) MEN tip II
- C) Cowden Sendromu
- D) Gardner Sendromu
- E) Wermer sendromu

54. Lazer-hedef kromofor eşleştirmelerinden hangisi **yanlıştır**?

*Lazer cerrahisi ve kozmetik dermatoloji (Zorluk derecesi: 3)*

- A) Ruby-melanin
- B) Q switch Nd:YAG-1064nm- hemoglobin**
- C) Diod-1450nm-su
- D) Karbondioksit-su
- E) Excimer-protein

55. Yirmi yaşında erkek hasta, gövdesinde sulantılı yaralar ile başvurdu. Şikayetlerinin 1 yıldır olduğunu, kortizonlu tabletler kullanınca geçtiğini belirtti. Yapılan biyopside nötrofil ve yer yer eozinofil içeren subepidermal bü; direkt immunfloresan incelemede ise bazal membran boyunca lineer IgA depolanması saptandı. Hastanın tedavisine başlamadan önce hangi tetkik öncelikle istenmelidir?

*Kronik büllü hastalıklar (Zorluk derecesi: 2)*

- A) Tiyopurin metil transferaz
- B) Açlık kan şekeri
- C) Kortizol düzeyi
- D) G6PD**
- E) İnsülin

56.

İdiopatik eritrodermi ile ilgili **yanlış ifadeyi** işaretleyiniz.

*Psoriasis, palmoplantar erüpsiyonlar, püstüler dermatitler ve eritrodermi (Zorluk derecesi: 3)*

- A) Genç kadın hastalarda daha sık görülür**
- B) Kronik ve nüks edici özelliktedir
- C) Şiddetli kaşıntı vardır
- D) Palmoplantar keratoderma vardır
- E) Dermatopatik lenfadenopati vardır

57. İmpetigo herpetiformis için hangisi **yanlıştır**?

*Psoriasis, palmoplantar erüpsiyonlar, püstüler dermatitler ve eritrodermi (Zorluk derecesi: 3)*

- A) Gebeliğin generalize püstüler psoriasis olarak kabul edilir
- B) Sıklıkla fleksural bölgelerden başlayarak yayılır
- C) Mukoz membran tutulumu görülmez**
- D) Subungual püstüllere bağlı onikoliz olabilir
- E) Hipokalsemi görülebilir

58.

Sistemik interferon hangisinin tedavisinde **kullanılmamaktadır**?

*Topikal ve sistemik tedaviler (Zorluk derecesi: 2)*

- A) Kutanöz T hücreli lenfoma
- B) Psoriasis**
- C) Skuamöz hücreli karsinom
- D) Skleromiksödem
- E) Behçet hastalığı

59. Gebelikte A kategorisinde yer alan ilacı işaretleyiniz.

*Topikal ve sistemik tedaviler (Zorluk derecesi: 3)*

- A) Mupirosin
- B) Azelaik asit
- C) Eritromisin
- D) Nistatin**

## E) Permetrin

60. Üç aylık erkek bebek, gövdesinde doğuşundan beri varolan beyaz leke şikayeti ile getirildi. Dermatolojik muayenesinde karında sınırları belli-belirsiz, Wood ışığı ile belirginleşmeyen, travma ile kızarıklık gözlenmeyen, yaklaşık 2 cm çaplı, hipopigmente yama saptandı. Geri kalan deri, tırnak ve mukoza muayenesi olağandı. Uygun tanı seçeneğini işaretleyiniz?

*Tanısal Girişimler (Zorluk derecesi: 3)*

- A) Vitiligo
- B) Nevus anemikus
- C) Nevus depigmentosus
- D) Nevus spilus
- E) İdiyopatik guttat hipomelanozis

61. Elektrofulgurasyon için doğru tanım hangisidir?

*Tanısal Girişimler (Zorluk derecesi: 4)*

- A) Monoterminal cihaz ile deriye dokunarak yüzeysel ablyasyon yapılması
- B) Monoterminal cihaz ile deriye yaklaşıp arada kıvılcım oluşturularak yüzeysel ablyasyon yapılması
- C) Biterminal cihaz ile derin koagülasyon yapılması
- D) Biterminal cihaz ile doku kesilirken oluşan ısının lateral yayılımı ile bir miktar koagülasyon sağlanması
- E) Yüksek frekanslı alternatif akım kullanılarak ısı oluşturulması

62. Dermoskopide görülen paralel sırt (ridge) paterni aşağıdakilerden hangisiyle ilişkilidir?

*Tanısal Girişimler (Zorluk derecesi: 2)*

- A) Desmoplastik malign melanom
- B) Nodüler malign melanom
- C) Süperfisial malign melanom
- D) Lentigo maligna
- E) Akral malign melanom

63. Kuzey Amerika Kontakt Dermatit Çalışma Grubu'nun belirlediği en sık tespit edilen ilk 10 allerjenden birisi **olmayan** seçeneği işaretleyiniz.

*Tanısal Girişimler (Zorluk derecesi: 4)*

- A) Nikel sodyum
- B) Neomisin sülfat
- C) Peru balzamu
- D) Formaldehid
- E) Lanolin

64. Keratoderma, dendritik keratit, korneal ülserler, mental retardasyonun birarada bulunduğu sendrom hangisidir?

*Pitriyazis rozea, pitriyazis rubra pilaris ve diğer papüloskuamöz hastalıklar (Zorluk derecesi: 4)*

- A) Richner Hanhart sendromu
- B) Pakionişi konjenita
- C) Papillon -Lefevre sendromu
- D) Mal de melada sendromu
- E) Vörner sendromu

65. Foto(kemo)terapi ile ilişkili doğru seçeneği işaretleyiniz.

*Topikal ve sistemik tedaviler (Zorluk derecesi: 2)*

- A) Goeckerman tedavisi, topikal antralin ile UVB irradyasyonu kombinasyonudur
- B) Excimer lazer fototerapisi, bir lokal PUVA yöntemidir.
- C) UVA1'in dalga boyu 320-340 nm arasındadır.

- D)** Oral 5-metoksipsoralen, oral 8-metoksipsoralenden daha az eritemojeniktir.  
**E)** PUVA eritemi 24-48. saatte pik yapar.

**66.** Rozase ayırıcı tanısında yer alan genodermatozu işaretleyiniz.

*Yağ ve ter bezlerinin hastalıkları (Zorluk derecesi: 4)*

- A)** Gorlin sendromu  
**B)** Werner sendromu  
**C)** Haber sendromu  
**D)** Turner sendromu  
**E)** Von hippel lindau sendromu

**67.** Gövde yanları ve uyluk iç yüzünde görülen maculae cerulae olarak adlandırılan lezyonlar hangisine bağlı olarak oluşur?

*Parazitik hastalıklar, ısırık ve sokmalar (Zorluk derecesi: 2)*

- A)** Reduviid böceği  
**B)** Phthirus pubis  
**C)** Kene  
**D)** Tahta kurusu  
**E)** Güve

**68.** Sigara ile ilişkisi diğerlerine göre daha belirgin olan Psoriasis formunu işaretleyiniz.

*Psoriasis, palmoplantar erüpsiyonlar, püstüler dermatitler ve eritrodermi (Zorluk derecesi: 2)*

- A)** Akrodermatitis continua  
**B)** İmpetigo herpetiformis  
**C)** Eritrodemik psoriasis  
**D)** Palmoplantar püstüler psoriasis  
**E)** Psoriasis vulgaris

**69.** Konjenital sifilizde sensitivitesi en yüksek test hangisidir?

*Cinsel yolla bulaşan hastalıklar (Zorluk derecesi: 2)*

- A)** VDRL  
**B)** Captia Ig M EIA  
**C)** FTA-ABS  
**D)** RPR  
**E)** MHA-TP

**70.** Üretral akıntı şikayeti olan 20 yaşında bir erkek hastadan alınan örnekte lökosit içinde ve dışında gram negatif diplokok görülürse hangisi düşünülür?

*Cinsel yolla bulaşan hastalıklar (Zorluk derecesi: 2)*

- A)** Neisseria gonorrhoeae  
**B)** Neissera meningitidis  
**C)** Mycoplasma hominis  
**D)** Ureaplasma urealiticum  
**E)** Candida albicans

**71.** Eritema nodozum için karakteristik olan, yağ dokuda nötrofiller ya da küçük yarık benzeri boşluklarla çevrili olma eğilimi gösteren küçük histiyosit kümelerine ne ad verilir?

*Subkutan yağ dokusu hastalıkları (Zorluk derecesi: 3)*

- A)** Miescher'in mikrogranülomları  
**B)** Virchow hücreleri  
**C)** Councilman cisimcikleri

- D) Russel cisimcikleri
- E) Michaelis-Gutman cisimcikleri

72. Saç dökülmesi şikayeti ile gelen bir hastanın saçlı derisinden alınan biyopside; follüküller normal boyutta, terminal ve vellüs tipi kıllar normal sayıda, follüküler anatomi bozulmuş, katagen saç sayısı artmış, trikomalazi ve pigment kastları izleniyor ve inflamasyon yoksa hangi tip saç dökülmesi söz konusudur?

*Saç ve tırnak hastalıkları (Zorluk derecesi: 3)*

- A) Telogen effluvium
- B) Skatrisyel alopesi
- C) Androgenetik alopesi
- D) Alopesi areata
- E) Trikotillomani

73. Trikoskopik incelemede hangisi/hangilerinin görülmesi telogen effluvium tanısını destekler?

- I- sarı-pembe noktalar
- II- ünlem işareti saçlar
- III- distrofik saçlar
- IV- saç kılı çaplarının eşit olması

*Saç ve tırnak hastalıkları (Zorluk derecesi: 3)*

- A) Yalnız IV
- B) I ve III
- C) II ve IV
- D) I, II ve III
- E) I, II, III ve IV

74. Granuloma anulare ile ilgili doğru seçeneği işaretleyiniz.

*Makrofaj ve monosit hastalıkları (Zorluk derecesi: 2)*

- A) Jeneralize granuloma anularenin tedaviye cevabı iyidir.
- B) En sık bacak ve ayaklarda görülür.
- C) Herpes zoster skarlarında granuloma anulare lezyonları gelişebilir.
- D) Subkutan granuloma anulare genellikle ileri yaşlarda görülür.
- E) Granuloma anulare erkeklerde daha fazla görülür.

75. Aşağıdaki glukokortikosteroidlerin hangisinin mineralokortikoid potensi en azdır?

*Topikal ve sistemik tedaviler (Zorluk derecesi: 3)*

- A) Kortizon
- B) Metilprednizolon
- C) Prednizolon
- D) Prednizon
- E) Hidrokortizon

76. Löfgren Sendromu için **yanlış** seçeneği işaretleyiniz.

*Makrofaj ve monosit hastalıkları (Zorluk derecesi: 3)*

- A) Daha çok İskandinav kökenli hastalarda görülür.
- B) Bilateral hiler lenfadenopati gözlenir.
- C) Gezici poliartrit, eritema nodozum ve üveit eşlik eder.
- D) Sarkoidozun akut başlangıç şeklidir.
- E) Bu klinik tabloyla başlayan sarkoidozun prognozu kötü seyreder.

77. Günümüzde de tüberküldler içinde yer alan seçeneği işaretleyiniz.

*Mikobakteriyal hastalıklar (Zorluk derecesi: 2)*

- A) Lupus miliaris disseminatus fasei
- B) Likenoid tüberkülid
- C) Papülonekrotik tüberkülid
- D) Granulomatöz rozase
- E) Eritema nodozum

78. Likenoid ilaç erupsiyonu için **yanlış** seçeneği işaretleyiniz.

*Pitriyazis rozea, pitriyazis rubra pilaris ve diğer papüloskuamöz hastalıklar (Zorluk derecesi: 2)*

- A) Histopatolojik olarak parakeratoz görülür
- B) Fotodağılım sıklıdır
- C) Ekzematöz veya psoriaziform olabilir
- D) Müköz membran tutulumu sıklıdır
- E) Hiperpigmentasyon sıklıdır

79. Purpurik dermatozların etyopatogenezinde **yer almayan** seçeneği işaretleyiniz.

*Kutanöz vasküler hastalıklar (Zorluk derecesi: 2)*

- A) Kapiller frajilite
- B) Venöz hipertansiyon
- C) Fokal enfeksiyon odağı
- D) Malignite
- E) İlaçlar

80. "İlaç-ilaca bağılı yan etki" eşleşmelerinden hangisi **uyumsuzdur**?

*Topikal ve sistemik tedaviler (Zorluk derecesi: 3)*

- A) Dapson-met hemoglobinemi
- B) Siklosporin-hipokalemi
- C) Metotreksat-fotosensivite
- D) Hidroksiklorokin- gri pigmentasyon
- E) Mikofenolat mofetil-lökopeni

81. Hangisi paterji pozitifliği nedenlerinden **değildir**?

*Tanısal Girişimler (Zorluk derecesi: 2)*

- A) Behçet hastalığı
- B) Piyoderma gangrenozum
- C) Eozinofilik selülit
- D) Sweet sendromu
- E) Barsak ilişkili dermatöz artrit sendromu

82. Hangisi septal pannikülit nedenidir?

*Subkutan yağ dokusu hastalıkları (Zorluk derecesi: 3)*

- A) Eritema induratum
- B) Travmatik pannikülit
- C) Subakut nodüler migratuar pannikülit
- D) Malinite ilişkili pannikülit
- E) Pankreatik pannikülit

83. Büllöz liken planus ve liken planus pemfigoides dermatozları ile ilgili verilen tanımlamalardan hangisi doğrudur?

*Pitriyazis rozea, pitriyazis rubra pilaris ve diğer papüloskuamöz hastalıklar (Zorluk derecesi: 4)*

- A) Liken planus pemfigoides büllöz pemfigoiddekine benzer şekilde yaşlı hastalarda daha sık gözlenir.

- B)** Liken planus pemfigoidesde genellikle deride önce büllöz lezyonlar ardından liken planus lezyonları gözlenirken; büllöz liken planusta deride önce liken planus lezyonları daha sonra büllöz lezyonlar gözlenir.
- C)** Büllöz liken planusda hastanın serumda 180 kDa ağırlığındaki BPAG2 antijenine karşı otoantikolar saptanabilir.
- D)** Büllöz liken planusda büllelerden alınan biyopsinin histopatolojik incelemesinde "Max-Joseph" boşluğu görülebilir.
- E)** Liken planus pemfigoidesde büllelerden alınan biyopsinin histopatolojik incelemesinde subepidermal ayrışma ve nötrofilden yoğun infiltrat göze çarpar.

**84.** Ramsay Hunt Sendromu ile ilişkili **olmayan** seçeneği işaretleyiniz.

*Viral infeksiyonlar (Zorluk derecesi: 3)*

- A)** Fasyal paralizi
- B)** Granülomatoz keilit
- C)** Dilde veziküller
- D)** Dil ön bölümde tat kaybı
- E)** Kulak ağrısı

**85.** Tırnak-Patella Sendromunun karakteristik tırnak bulgusu hangisidir?

*Saç ve tırnak hastalıkları (Zorluk derecesi: 3)*

- A)** Raket tırnaklar
- B)** "Pterygium inversum unguis"
- C)** Üçgen lunula
- D)** Mees çizgileri
- E)** Longitudinal melanonişi

**86.** Sıklıkla akneye sebep olan ilacı işaretleyiniz.

*Yağ ve ter bezlerinin hastalıkları (Zorluk derecesi: 3)*

- A)** Karbamezapin
- B)** Valproik asit
- C)** Metotraksat
- D)** Lityum
- E)** Hidroksiklorokin

**87.** Hangisi Wood ışığıyla floresan **vermez?**

*Tanısal Girişimler (Zorluk derecesi: 3)*

- A)** Trichophyton schoenleinii'ye bağlı favus
- B)** Malassezia spp'e bağlı tinea versikolor
- C)** Epidermophyton floccosum'a bağlı tinea cruris
- D)** Microsporum spp'e bağlı tinea kapitis
- E)** Corynebacterium minutissimum'a bağlı eritrazma

**88.** Jeneralize püstüle psoriasisin klinik ve sistemik bulgularıyla taklit edebildiği kalıtsal otoinflamatuvar hastalıklar arasında **yer almayan** seçeneği işaretleyiniz.

*Psoriasis, palmoplantar erüpsiyonlar, püstüler dermatitler ve eritrodermi (Zorluk derecesi: 5)*

- A)** DIRA
- B)** DITRA
- C)** CARD14
- D)** ADAM17
- E)** CAPS

**89.** Liken skleroz için hangisi **söylenemez?**

*Pitriyazis rozea, pitriyazis rubra pilaris ve diğer papüloskuamöz hastalıklar (Zorluk derecesi: 4)*

- A) Ekstrasellüler matriks protein-1'e karşı oluşan antikolar hastalık aktivitesinde rol oynamaktadır.
- B) Kadınlarda otoimmün tiroid insidansı daha fazladır.
- C) Oksidatif stres patogeneğinde rol oynamaktadır.
- D) MHC sınıf II antijeni HLA-DQ7 ile ilişki saptanmıştır.
- E) Antinükleer antikor pozitifliğine rastlanmaz.

90. Skabies tedavisi ile ilgili **yanlış** seçeneği işaretleyiniz.

*Parazitik hastalıklar, ısırık ve sokmalar (Zorluk derecesi: 4)*

- A) En etkili tedavi ivermektin tablettir.
- B) Permetrinin gebelik kategorisi B olup güvenle kullanılabilir.
- C) İnfantta FDA onayı olan tek ürün permetrindir.
- D) Krotamiton krem oldukça etkili bir üründür, ancak güvenlik çalışmaları yetersizdir.
- E) Lindan kreme rezistans sık gelişir.

91. Eritema infeksiyozum ile ilgili **yanlış** seçeneği işaretleyiniz.

*Viral infeksiyonlar (Zorluk derecesi: 3)*

- A) Hastalığın etkeni Parvovirus B19 dur.
- B) Hastalık; respiratuar salgılar, kan ürünleri veya vertikal yolla geçebilir.
- C) Altıncı hastalık olarak da adlandırılır.
- D) İnkubasyon süresi 4-14 gün arasında değişir.
- E) Komplikasyon olarak aplastik kriz gelişebilir. .

92. "Nagayama spots" hangi hastalık için spesifiktir?

*Viral infeksiyonlar (Zorluk derecesi: 3)*

- A) Eritema infeksiyozum
- B) Roseala infantum
- C) El ayak ağız hastalığı
- D) Kızamıkçık
- E) Herpangina

93. "Derin kimyasal soyma" amacıyla kullanılan seçeneği işaretleyiniz.

*Tanısız Girişimler (Zorluk derecesi: 3)*

- A) Rezorsinol
- B) Salisilik asit
- C) Glikolik asit
- D) Jessner solüsyonu
- E) Baker-Gordon fenol solüsyonu

94. Dolgu uygulamalarının komplikasyonlarından olan "Tyndall etkisi"nin nedeni hangisidir?

*Tanısız Girişimler (Zorluk derecesi: 3)*

- A) Yabancı cisim granülomu oluşumu
- B) Yüksek basınçlı injeksiyon uygulanması
- C) Hipersensitivite reaksiyonu
- D) Yüzeysel uygulanan injeksiyon
- E) Biyofilm oluşumu

95. İnfantil akut hemorajik ödem için doğru ifadeyi işaretleyiniz.

*Kutanöz vasküler hastalıklar (Zorluk derecesi: 3)*

- A) Genellikle iki yaş üzerindeki çocuklarda görülür



- B) Orta boy damarların tutulduğu bir vaskülit formudur
- C) Kız bebeklerde erkek bebeklere göre biraz daha sık olarak görülür
- D) Sıklıkla sistemik tutulumu neden olur
- E) Tipik histopatolojik bulgusu lökositoklastik vaskülitir

96. Behçet Hastalığı ile ilgili **yanlış** seçeneği işaretleyiniz.

*Kutanöz vasküler hastalıklar (Zorluk derecesi: 3)*

- A) Major aftlar kadınlar arasında daha sık olarak görülür
- B) Paterji testi erkek hastalarda daha şiddetlidir
- C) Papülopüstüler belirtilerin sık bulunması reaktif artrit varlığını işaret eder
- D) Eklem tutulumu çoğunlukla oligoartikülerdir
- E) Eritema nodozum benzeri lezyonlar kadınlarda daha sık görülür

97. Kriyocerrahi için **yanlış** ifadeyi işaretleyiniz.

*Tanısıl Girişimler (Zorluk derecesi: 2)*

- A) Benign, premalign ve malign lezyonların tedavisinde kullanılmaktadır
- B) Malign lezyonların hasarlanması için daha düşük sıcaklıklara gereksinim vardır
- C) Kriyojen olarak en fazla sıvı nitrojen tercih edilir
- D) Melanositler donmaya keratinositlere göre daha dayanıklıdır
- E) Benign lezyonlarda donma lezyon sınırının 2-3 mm lateraline uzanmalıdır

98. Dermatoskopik olarak 'jet ve bulutu' görünümü hangi hastalıkta görülür?

*Tanısıl Girişimler (Zorluk derecesi: 2)*

- A) Bazal hücreli karsinom
- B) Uyuz
- C) Malign melanom
- D) Leishmaniazis
- E) Liken planus

99. Eritema nodozum veya eritema nodozum benzeri lezyonlar hangi hastalıkta vaskülit özelliği gösterir?

*Kutanöz vasküler hastalıklar (Zorluk derecesi: 5)*

- A) Tüberküloz
- B) Sarkoidoz
- C) Behçet Hastalığı
- D) Streptokok infeksiyonları
- E) İnflamatuar Barsak Hastalığı

100. Akne ile ilgili **yanlış** seçeneği işaretleyiniz.

*Yağ ve ter bezlerinin hastalıkları (Zorluk derecesi: 3)*

- A) Solid fasial ödem (Morbihan hastalığı) akne komplikasyonlarından biridir.
- B) Post-adölesan akne, yüzün alt üçte birlik kısmındaki papülonodüller ile karakterizedir.
- C) Post-adölesan akne, serum androjen seviyeleri normale hormon tedavisine iyi yanıt vermez.
- D) Akne fulminansa osteolitik kemik lezyonları eşlik edebilir.
- E) PAPA sendromu; pyojenik artrit, pyoderma gangrenozum ve akne ile karakterize otozomal dominant otoinflamatuvar bir bozukluktur.

KAPAT